

# **TAXOFEN<sup>®</sup>**

Blau Farmacêutica S.A.

Comprimido Revestido

10 mg e 20 mg

**MODELO DE BULA DO PACIENTE RDC 47/09**

**TAXOFEN<sup>®</sup>**

**citrato de tamoxifeno**

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

**APRESENTAÇÕES**

Comprimido revestido 10 mg. Embalagem contendo 30 ou 250 comprimidos revestidos.

Comprimido revestido 20 mg. Embalagem contendo 30 ou 250 comprimidos revestidos.

**USO ORAL**

**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido de 10 mg contém:

citrate de tamoxifeno (equivalente a 10 mg de tamoxifeno).....15,2 mg

excipientes q.s.p. .... 1 comprimido revestido

excipientes: lactose monoidratada, amido, croscarmelose sódica, gelatina, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol e dióxido de titânio.

Cada comprimido revestido de 20 mg contém:

citrate de tamoxifeno (equivalente a 20 mg de tamoxifeno) ..... 30,4 mg

excipientes q.s.p. ....1 comprimido revestido

excipientes: lactose monoidratada, amido, croscarmelose sódica, gelatina, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio e corante vermelho laca.

**D) INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) é indicado para o tratamento do câncer de mama.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O uso contínuo de Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) inibe o crescimento do câncer de mama. Esses benefícios parecem ser independentes da idade, da fase da menopausa e da dose do medicamento.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você não deve utilizar Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) nas seguintes situações:

- Alergia ao citrate de tamoxifeno ou a qualquer um dos componentes do medicamento.
- Em caso de gravidez, se estiver tentando engravidar ou amamentando.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

O Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) deve ser utilizado com cuidado nas seguintes situações:

- Em pacientes no período pré-menopausa, pois a menstruação pode ser interrompida.
- Em pacientes que usam métodos contraceptivos hormonais para evitar a gravidez, pois alguns podem afetar o efeito de Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno).
- Em pacientes com sangramento vaginal ou outros sintomas ginecológicos (como dor pélvica) que estejam tomando ou que já tenham tomado Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno). Podem ocorrer algumas alterações na parede do útero (endométrio), incluindo câncer.
- Em pacientes com angioedema (inchaço da pele) hereditário. Taxofen<sup>®</sup> pode induzir ou exacerbar os sintomas de angioedema.

O citrate de tamoxifeno pode aumentar o risco de complicações microvasculares do enxerto em cirurgias tardias de reconstrução de mama.

Não se espera que Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) afete a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Entretanto, foi relatada fadiga (cansaço) com o uso de citrate de tamoxifeno e deve-se ter cuidado ao dirigir veículos e operar máquinas, enquanto este sintoma persistir.

Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) deve ser utilizado com cuidado em pacientes que estejam tomando anticoagulantes (ex. varfarina), quimioterápicos, rifampicina e antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ex. paroxetina).

Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) não deve ser utilizado ao mesmo tempo com inibidores da aromatase como anastrozol, letrozol e exemestano.

#### **Uso durante a gravidez e amamentação**

Você não deve engravidar ou amamentar durante o tratamento com Taxofen<sup>®</sup> e por 9 meses após a interrupção do tratamento. Consulte o médico para aconselhamento sobre a contracepção.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.**

**Este medicamento pode causar doping.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose. Atenção: Contém lactose.**

**Atenção: Cada comprimido revestido de 10 mg contém 102,3 de lactose monoidratada. Cada comprimido revestido de 20 mg contém 204,6 de lactose monoidratada.**

**Atenção: Cada comprimido revestido de 10 mg contém o corante dióxido de titânio que pode, eventualmente, causar reações alérgicas. Cada comprimido revestido de 20 mg contém os corantes dióxido de titânio e corante vermelho laca que podem, eventualmente, causar reações alérgicas.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) deve ser mantido em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

**Prazo de Validade:** 24 meses a partir da data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### **Características do medicamento**

**Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) 10 mg:** Comprimido revestido circular, biconvexo e de coloração branca

**Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) 20 mg:** Comprimido revestido circular, biconvexo e de coloração rosa

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) deve ser administrado por via oral, com água, de preferência no mesmo horário todos os dias.

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

#### **Posologia**

**Adultos (inclusive idosos)**

No início da doença, recomenda-se que o tratamento com Taxofen® (citato de tamoxifeno) se estenda por não menos do que 5 anos. A duração ótima do tratamento com Taxofen® (citato de tamoxifeno) ainda não foi estabelecida.

A dose diária recomendada de Taxofen® (citato de tamoxifeno) é de 20 mg, em dose única diária ou fracionada (separadas) em duas doses (2 comprimidos de 10 mg). Não ocorrendo resposta satisfatória após 1 ou 2 meses, deve-se aumentar a dose para 20 mg 2 vezes ao dia.

### **Crianças**

O uso de Taxofen® (citato de tamoxifeno) em crianças não é recomendado, pois a segurança e a eficácia não foram estabelecidas.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você se esqueça de tomar o comprimido de Taxofen® (citato de tamoxifeno), você só pode tomar este comprimido que foi esquecido se estiver faltando mais de 12 horas para tomar a dose do dia seguinte.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Podem ocorrer as seguintes reações adversas com o uso de Taxofen® (citato de tamoxifeno):

**Reação muito comum** (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

náusea, retenção de líquidos (possivelmente vista como tomoses inchados), sangramento vaginal, corrimento vaginal, erupções cutâneas (erupções na pele, coceira ou descamação da pele), fogaços (ondas de calor) e fadiga (cansaço) e depressão.

**Reação comum** (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): anemia, catarata, retinopatia (lesão na retina), reações de hipersensibilidade (reações alérgicas), elevação dos níveis de triglicérides, câibras, mialgia (dores musculares), miomas uterinos (que também podem ser vistos como desconforto pélvico ou sangramento vaginal), eventos cerebrovasculares isquêmicos (derrame cerebral), cefaleia (dores de cabeça), delírios, distúrbios sensoriais (incluindo parestesia [sensação de dormência/formigamento] e disgeusia [distorção ou diminuição do paladar]), prurido vulvar (coceira na vulva, parte específica da vagina), alterações endometriais (alterações da parhede do útero, incluindo hiperplasia [espessamento] e pólipos), alopecia (perda de cabelo), vômito, diarreia, constipação, alterações nas enzimas do fígado, esteatose (gordura no fígado) e eventos tromboembólicos (incluindo trombose venosa profunda, trombose microvascular e embolia pulmonar).

**Reação incomum** (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):

trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue - plaquetas), leucopenia (diminuição dos glóbulos brancos do sangue), alterações da visão, pancreatite (inflamação do pâncreas), hipercalemia em pacientes com metástase óssea (concentração superior ao normal de íons de potássio no sangue), câncer endometrial (revestimento interno da parede do útero), pneumonite intersticial (inflamação dos pulmões, que podem apresentar sintomas como pneumonia, falta de ar e tosse) e cirrose do fígado.

**Reação rara** (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): neutropenia (diminuição anormal do número de neutrófilos no sangue), agranulocitose (diminuição dos granulócitos no sangue), alterações na córnea, neuropatia óptica (doenças do nervo óptico), sarcoma uterino (principalmente tumores malignos mistos de Müller), endometriose, inchaço ovariano cístico, pólipos vaginais, tumor Flare, neurite óptica (inflamações do nervo óptico), hepatite, colestase (diminuição do fluxo da bile), insuficiência hepática, lesão hepatocelular (lesão das células hepáticas), necrose do fígado, angioedema (inchaço da pele, mucosas, vísceras e cérebro), síndrome de Stevens-Johnson (alterações graves na pele), necrólise epidérmica tóxica (alterações graves na pele), vasculite cutânea (inflamação dos vasos sanguíneos mais superficiais da pele), pênfigo bolhoso (aparecimento de bolhas na pele e mucosas como boca e vagina) e eritema multiforme (alterações graves na pele como vermelhidão, bolhas e descamação).

**Reação muito rara** (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): lúpus eritematoso cutâneo, porfíria cutânea tardia e reação inflamatória de pele, semelhante à observada em pacientes submetidos à radioterapia.

**Reação com frequência desconhecida:** Exacerbação de angioedema (inchaço na pele) hereditário.

Você deve parar de tomar Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) e procurar o seu médico imediatamente nas seguintes situações:

- Se tiver dificuldade para respirar com a presença ou não de inchaço na face, lábios, língua e/ou garganta.
- Se tiver inchaço na face, lábios, língua e/ou garganta causando dificuldade para engolir.
- Se você tiver inchaço nas mãos, pés ou tornozelos.
- Se você tiver vermelhidão na pele.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não existe tratamento específico para o caso de superdosagem com Taxofen<sup>®</sup> (citrate de tamoxifeno) e, teoricamente, a superdosagem pode causar aumento das reações adversas mencionadas.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **II) DIZERES LEGAIS**

**Registro: 1.1637.0027**

Registrado por:

**Blau Farmacêutica S.A.**

CNPJ 58.430.828/0001-60

Rodovia Raposo Tavares Km 30,5, n° 2833.

CEP: 06705-030. Cotia, SP.

www.blau.com

Produzido por:

**Blau Farmacêutica S.A.**

CNPJ 58.430.828/0002-40

Avenida Ivo Mário Isaac Pires, n° 7602.

CEP: 06720-480. Cotia, SP.



#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 17/06/2021.**

### Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
27/05/2014	0416840/14-2	10457 – SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	27/05/2014	0416840/14-2	10457 – SIMILAR – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	27/05/2014	Todos	VP	10 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL AL X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250

									20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 250
03/07/2015	0588429/15 -2	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	03/07/2015	0588429/15 -2	10450 – SIMILAR – Notificaçã o de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	03/07/2015	8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	10 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL AL X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30

									10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250  20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 250
30/03/2016	1432197/16 -1	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambialidad e	30/03/2016	1432197/16 -1	10756 - SIMILAR - Notificaçã o de alteração de texto de bula para adequação à	30/03/2016	Identificação do Medicamento (para adequação à intercambialidade )  II) Dizeres Legais	VP	10 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL AL X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 30



					intercambi alidade				10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30
									10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250
									20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30
									20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250
									20 MG COM REV CT BL AL AL X 250

11/01/2022	0143679/22 -8	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/01/2022	0143679/22 -8	10450 – SIMILAR – Notificação o de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	11/01/2022	Atualização do banco de dados da Anvisa (correção de arquivo)	VP	10 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL AL X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250  20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  20 MG COM REV CT BL
------------	------------------	--	------------	------------------	---	------------	--	----	---

									AL PLAS AMB X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 250
07/06/2023	0581213/23 -8	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/06/2023	0581213/23 -8	10450 – SIMILAR – Notificaçã o de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	07/06/2023	4.O que devo saber antes de usar este medicamento  8. Quais os males que este medicamento pode me causar	VP	10 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL AL X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250

									20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30  20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 250
06/08/2024	-	10450 – SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/08/2024	-	10450 – SIMILAR – Notificaçã o de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	06/08/2024	4. O que devo saber antes de usar este medicamento II) Dizeres Legais	VP	10 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL AL X 250  20 MG COM REV CT BL AL AL X 30  10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30

									10 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250
									20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30
									20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 250
									20 MG COM REV CT BL AL AL X 250